

โรคหัด

โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้นจึงไม่มียาที่รักษาโดยตรง ปรึกษาแพทย์ วิธีดูแล และโรคแทรกซ้อนต่างๆ



สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส Measles เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจ ติดต่อทางเสมหะ ทางน้ำลาย มักเป็นในเด็กเล็ก



อาการ

มีไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลัวแสง ต่อมา มีผื่นบวมแดงเป็นปื้นที่ใบหน้า บริเวณขอบผม แล้วแพร่กระจายไปตามลำตัว แขน ขา



การรักษา

- 1) ให้เช็ดตัว และยาลดไข้ แต่ห้ามใช้ยา aspirin ในการลดไข้ แยกเด็กป่วย พักผ่อน และให้อาหารอ่อนย่อยง่าย
- 2) กระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำมากๆ อาจเป็นน้ำเปล่า น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ
- 3) อาจจะติดเชื้อแบคทีเรียที่หูและปอด ได้ง่าย



การป้องกัน

โดยรับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง วัคซีนมีทั้งชนิดเดี่ยวและรวมกับหัดเยอรมันและคางทูม(MRR) ขอรับการฉีดได้ที่สถานีอนามัยทุกแห่งใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลทั่วไป

“ ฉีดวัคซีนตามเวลา หมั่นปัญหาโรคหัด ”



งานสื่อสารความเสี่ยง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.นราธิวาส



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคหัด

โรคหัดมักเกิดขึ้นกับเด็ก

พบมากสุดในกลุ่ม

อายุ 0-4 ปี




3

ภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง

และอาจทำให้เสียชีวิตได้ !



หูอักเสบ



ปอดอักเสบ



สมองอักเสบ

สามารถป้องกันโรคหัดได้

ด้วยการ

ฉีดวัคซีน



(เข็มแรกตอนอายุ 9 เดือน

และเข็มที่สอง ตอนอายุ 2 ขวบครึ่ง)



โรคหัดสามารถ

เป็นแล้ว

หายเองได้



สามารถค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
<https://goo.gl/EnrNSb>

งานสื่อสารความเสี่ยง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

สสจ.นราธิวาส



โรคหัด

MEASLES

โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้นจึงไม่มียา
รักษาโดยตรง ควรปรึกษาแพทย์ วิถีดูแล
และโรคแทรกซ้อนต่างๆ



สาเหตุ:

เกิดจากเชื้อไวรัส Measles เป็นโรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ติดต่อกันโดย ไอ จาม พุดคุยใน
ระยะใกล้ชิดทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เป็นได้ทุกวัย
ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กที่ไม่ได้รับวัคซีนโรคหัด

อาการ:



มีไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง
ตาแฉะ และกลั้วแสบ ต่อมา
มีผื่นนูนแดงเป็นปื้นที่ใบหน้า
บริเวณขอบผม แล้วแพร่
กระจายไปตามลำตัว แขน ขา
ภายใน 2-3 วัน

การป้องกัน:



ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 9-12
เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง
วัคซีนมีทั้งชนิดเดี่ยวและรวมกับหัด
เยอรมันและคางทูม (MMR)

การรักษา:

- เช็ดตัวและยาลดไข้ แต่ห้ามใช้
ยา aspirin ในการลดไข้ แยก
เด็กป่วย และให้อาหารอ่อน
- ให้ดื่มน้ำมากๆ ป้องกันการ
ขาดน้ำ

ขอรับการฉีดได้ที่:

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ทุกแห่งใกล้บ้าน



งานสื่อสารความเสี่ยง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

สสจ.นราธิวาส